

ПАМЯТКА

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Сибирская язва – остро протекающее заболевание всех видов сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, характеризующееся явлениями сепсиса, интоксикации и образованием на участках тела разной величины карбункулов, в большинстве случаев заканчивается смертью.

Восприимчивы к сибирской язве домашние животные – крупный и мелкий рогатый скот, овцы, буйволы, лошади, ослы, олени и верблюды, свиньи. К сибирской язве восприимчив и человек.

Источниками возбудителя инфекции являются больные животные. Факторами его передачи – трупы животных, обсемененные этим возбудителем, почва, корма, вода, навоз, подстилка, предметы ухода за животными, сырье и продукты животного происхождения. Переносчиками возбудителя могут быть плотоядные животные, птицы, кровососущие насекомые.

Сибирская язва относится к почвенной инфекции. Возбудитель сохраняется в почве более 300 лет.

Заражение происходит чаще на пастбищах. Сибирская язва регистрируется чаще всего в летний период, реже зимой при поедании животными инфицированного корма. Смертность от этого заболевания достигает 100 %.

Заражение человека происходит при контакте с трупами (при вскрытии погибших от сибирской язве животных), или при разделке мяса зараженного животного.

Наиболее восприимчивы к сибирской язве крупный и мелкий рогатый скот, лошади и другие однокопытные, верблюды, олени, дикие травоядные всех видов. Молодые животные более восприимчивы, чем взрослые.

При молниеносном течении больной крупный рогатый скот возбужден, температура тела повышается до 41–42 °С, слизистые оболочки глаз становятся синюшными. Животное внезапно падает и в судорогах погибает.

При остром течении наблюдается повышение температуры тела до 42 °С, дрожь, синюшность слизистых оболочек глаз и кровоизлияния, а также вздутие рубца (тимпания). Длительность болезни составляет до 2–3 суток.

Хроническое течение проявляется похудением, отеками под нижней челюстью и опуханием подчелюстных и заглочных лимфатических узлов. Нередко сибирская язва проявляется в так называемой карбункулезной форме, при которой на месте проникновения возбудителя и других участках тела появляется твердый, хорошо очерченный болезненный отек кожи и подкожной клетчатки, а в дальнейшем в центре отека образуются язвы.

Больных животных лечат. Трупы животных сжигают.

Главные направления профилактики сибирской язве – **вакцинация** восприимчивых животных, учет и ликвидация «почвенных очагов».

С целью профилактики данного заболевания необходимо соблюдать следующие условия:

- регистрировать в администрации сельского поселения и государственных учреждениях ветеринарии по месту содержания животных приобретенных, новорожденных животных;
- не допускать ввода животных из других хозяйств и населенных пунктов, а также перемещения животных внутри хозяйства без разрешения государственной ветеринарной службы района;
- приобретать, продавать крупный рогатый скот необходимо только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых государственными учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье животных, благополучие местности по особо опасным инфекционным заболеваниям;
- приобретать продукцию животного происхождения (молоко, мясо и т. д.) в строго установленных местах (рынки, магазины и т. д.)
- предоставлять по требованию ветеринарных специалистов животных для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок;
- создавать условия для проведения ветеринарных мероприятий;
- предоставлять все необходимые сведения о приобретенных животных;
- обеспечивать выполнение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических правил по кормлению, содержанию, использованию животных и уходу за ними;
- соблюдать правила сбора утилизации и уничтожения биологических отходов (трупов животных);
- выполнять требования ветеринарных специалистов по соблюдению ветеринарно- санитарных правил по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных.
- о каждом случае падежа, заболевания животных вне зависимости от предполагаемого диагноза, а также по вопросам профилактики и борьбы с заразными болезнями, обращаться к ветеринарным специалистам в населенных пунктах или в районный филиал ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО».

[Ветеринарные правила по Сибирской язве № 648 от 21 сентября 2021 года](#)

Помните!

Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать заноса сибирской язве, на ваши подворья и позволить избежать возникновения и распространения заболевания, и как следствие — экономического ущерба, административной и уголовной ответственности.

О каждом случае падежа, заболевания животных вне зависимости от предполагаемого диагноза, а также по вопросам профилактики и борьбы с заразными болезнями животных, обращаться к ветеринарным специалистам территориального отдела по Красносулинскому району в населенных пунктах района или в **территориальный отдел по Красносулинскому району ГБУ РО «Шахтинская межрайонная СББЖ»** по адресу: г. Красный Сулин, ул. Московская, д. 24 тел. (код города 86367) 5-29-45; 5-03-59; 89094091086